

Esquema regular de Vacunación

0 a 12 meses

12 a 18 meses

Edad	Vacuna
Recién nacidos	BCG
	Hepatitis B
2 meses	Polio Inactivo
	Pentavalente
	Rotavirus
	Neumococo
	Polio Inactivo
4 meses	Pentavalente
	Rotavirus
	Neumococo
	Polio inactivo
6 meses	Pentavalente
	Influenza estacional
	Influenza estacional

Edad	Vacuna	
	Antes	Ahora
12 meses	Triple Viral	
	Influenza	
	Varicela	
	Hepatitis A	
	Neumococo	
18 meses	Polio Inactivo	Polio Intramuscular
	DPT	Pentavalente (Cambió la vacuna de DPT por dosis de refuerzo 1 de pentavalente vía intramuscular).
	Fiebre Amarilla	
		Triple Viral (Se adiciona la dosis de refuerzo a los 18 meses o antes de cumplir los 5 años. Se adelanta esta dosis la cual estaba a los 5 años).

5 años

Niños nacidos entre el

1 de enero de 2010 hasta 31 de diciembre de 2019


Antes	Ahora
DPT	BCG
Polio	Polio Inactivo
Triple Viral	Se aplicará solo en caso de que el niño no se haya vacunado con esta dosis antes de los 5 años.
Varicela	Varicela

Sarampión y Rubéola

(Aplicar solo a los niños que no se han vacunado con esta dosis adicional).

De 9 años en adelante

Edad	Vacuna	Dosis
Niñas de 9 a 17 años	VPH	Única dosis
Niños de 9 años		
Mujeres en edad fértil 10 a 49 años	Toxoide tetánico diftérico del adulto (T.d)	5 dosis
		Td1 dosis Inicial
		Td2 al mes de Td1
		Td3 a los 6 meses de Td2
		Td4 al año de la Td3
		Td5 al año de la Td4
Refuerzo cada 10 años		
Mayores de 60 años	Influenza estacional	Única
Gestantes	DPT acelular	Dosis a partir de la semana 26 de gestación en cada embarazo
	Influenza estacional	Una dosis a partir de la semana 14 de gestación.



Inicie y complete su esquema de vacunación contra el **Covid 19** a partir de los **6 meses de vida**.